



SIC Lago di Segrino IT2020010



# PARCO LAGO SEGRINO



COMUNI DI EUPILIO - CANZO - LONGONE AL SEGRINO

COMUNITÀ MONTANA TRIANGOLO LARIANO

## L'AVIFAUNA ACQUATICO-PALUSTRE

Le ampie fasce di canneto sulle sponde del lago offrono rifugio a numerosi uccelli stanziali e migratori, quali il germano reale (*Anas platyrhynchos*), lo svasso maggiore (*Podiceps cristatus*), la gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), la folaga (*Fulica atra*), l'airone cinerino (*Ardea cinerea*), il martin pescatore (*Alcedo atthis*), la cannaiola (*Acrocephalus scirpaceus*), il Cannareccione (*Acrocephalus arundinaceus*). Complessivamente la check - list ornitologica del Parco elenca 88 specie di uccelli nidificanti e 44 migratori.



**SVASSO MAGGIORE**  
(*Podiceps cristatus*)

È facilmente riconoscibile per i caratteristici ciuffi auricolari nerastri e un evidente pennacchio castano scuro ai lati della testa, che perde durante l'inverno.



**GERMANO REALE**  
(*Anas platyrhynchos*)

Il maschio di questa specie è coloratissimo, con il caratteristico capo verde scuro, il collare bianco e il petto bruno porporino, mentre la femmina è brunastra.



(foto di E. Ruggeri dal sito [www.liguriabirding.net](http://www.liguriabirding.net))

**GALLINELLA D'ACQUA**  
(*Gallinula chloropus*)

È caratterizzata dal piumaggio nero con una vistosa placca rossa sulla fronte.



(foto di G. Motta dal sito [www.liguriabirding.net](http://www.liguriabirding.net))

**FOLAGA**  
(*Fulica atra*)

Simile per aspetto alla gallinella d'acqua, ha però dimensioni maggiori e il becco e la placca frontale bianchi.

**AIRONE CINERINO**  
(*Ardea cinerea*)

È alto fino ad un metro circa, con lunghe ed esili zampe e piumaggio grigio-azzurro picchiettato di macchie nere all'attaccatura delle ali e sulla coda. Dietro la nuca presenta una caratteristica cresta nera costituita da poche piume lunghe e filiformi.



(foto di B. Caua dal sito [www.liguriabirding.net](http://www.liguriabirding.net))

**MARTIN PESCATORE**  
(*Alcedo atthis*)

Il suo piumaggio ha un'inconfondibile colorazione blu-turchese sul dorso (che può diventare verde-smeraldo a seconda della rifrazione della luce) e arancio-cannella sul ventre; la gola è bianca e le zampe sono di un brillante rosso corallo.



**CANNAIOLA**  
(*Acrocephalus scirpaceus*)

Ha il dorso di colore bruno chiaro e le parti inferiori bianco-fulvicce. Nidifica in colonie, sospendendo il nido alle canne.



(foto di M. Fortunato dal sito [www.liguriabirding.net](http://www.liguriabirding.net))

**CANNARECCIONE**  
(*Acrocephalus arundinaceus*)

È simile alla cannaiola, ma di maggiori dimensioni.



(foto di G. Motta dal sito [www.liguriabirding.net](http://www.liguriabirding.net))

Testi a cura di Silvia Fasana (Gruppo Naturalistico della Brianza), Silvia Speziale (Parco Lago Segrino) - Grafica e stampa: Grafica Marelli Como - Novembre 2008



**Gruppo Naturalistico della Brianza ONLUS**  
Associazione per la Difesa della Natura in Lombardia

CON IL CONTRIBUTO DI:



**fondazione cariplo**



Provincia di Como



Parco Lago Segrino